




## راه های پیشگیری از آنفولانزا:

برای پیشگیری از این بیماری باید دستهای خود را در طول روز چندین بار با آب و صابون بشویید، از تماس دستهای آلوده با چشم، دهان و بینی خودداری کنید؛ در مواجهه با بیماران و افراد مبتلا از ماسک استفاده کنید و سعی کنید فاصله حداقل یک متری را از این بیماران حفظ کنید، در زمان شیوع بیماری آنفولانزا از دست دادن و روپوسی با کردن با دیگران خودداری کنید.  
اگر کسی فرزندش به آنفولانزا مبتلا شد، او را چند روزی به مدرسه نفرستد یا خانه استراحت کنند. همچنین افراد مبتلا در خانه یک حالت خودقدرتی‌گی برای خودشان ایجاد کنند. یعنی اگر یکی از اعضای خانواده در اتفاق دیگر، در خیر این صورت همه افراد تاق بخوابید و سایر اعضای خانواده در اتفاق دیگر، در خیر این صورت همه افراد خانواده به آنفولانزا مبتلا می‌شود.  
بهترین کار، شستن دست ها و بعد از آن، داشتن لیوان و بشقاب،  
قاشق و چنگال خصوصی است



## اقدامات مدیریتی نظام سلامت:

- استقرار نظام مراقبت سندرومیک ✓
- خودداری از تجویز بی رویه آنتی بیوتیک به این بیماران ✓
- عدم ارائه بدون نسخه آنتی بیوتیک توسط داروخانه ها ✓
- آمادگی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی جهت پذیرش بیماران ✓
- رعایت اصول محافظتی توسط پرسنل بهداشتی درمانی ✓
- آمادگی آزمایشگاه ها جهت بررسی مواد مشکوک ✓
- آموزش به مردم به ویژه گروه های اسیب پذیر جهت اقدامات پیشگیرانه و واکسیناسون ✓
- اطلاع رسانی صحیح و به موقع به جامعه ✓

## نهیه و تنظیم:

مصطفی جوادی، کارشناس بهداشت حرفة ای

## اقدامات موثر جهت کاهش علائم و بهبود بیماری آنفولانزا:

- استراحت در منزل بویژه در هنگام تب: بهترین درمان برای آنفولانزا استراحت است.
- استفاده از مایعات فروان مانند آب، آب میوه و سوب رقیق. غرغره آب یا آب نمک ولرم چند بار در روز باعث می‌شود سوزش گلو بهبود یابد.
- خودداری از استعمال دخانیات، سیگار و الکل
- استفاده از قطره‌های بینی حاوی آب و نمک برای تخفیف گرفتگی بینی، موثر است. قطره‌های بینی که حاوی آب و نمک (سرم فیزیولوژی) هستند به کاهش ترشحات بینی و مرتبط شدن پوست داخل بینی کمک می‌کنند.
- برای افزایش رطوبت هوا از یک دستگاه بخور استفاده نمایید. رطوبت کمک می‌کند تا ترشحات ریه رقیق و بنابراین راحت تر تخلیه شوند. دستگاه را روزانه تمیز کنید.
- روی عضلاتی که دچار درد هستند کمپرس گرم یا صفحه گرم کننده بگذارید.
- ورزش: نرمش و ورزش کردن سبک نه تنها قدرت بدنیتان را افزایش می‌دهید، بلکه باعث تقویت سیستم دفاعی بدنیان هم می‌شود.
- از استرس و فشارهای روحی دوری کنید

## توصیه های تغذیه ای در آنفولانزا:

- ممکن استها به هنگام آنفولانزا کم می‌شود. شاید در ابتدا فقط اشتها به مایعات داشته باشید، پس از مدتی به وعده‌های غذایی کوچک حاوی مواد نشاسته‌ای بدون ادویه (نان سوخاری، برنج، پوره، غلات پخته شده، سیب‌زمینی پخته) اشتها پیدا کنید.
- روزانه حداقل ۸ لیوان آب بنوشید (خصوصاً اگر تبیتان بالا باشد).
- نوشیدن مایعات بیشتر مثل آب میوه، چای و نوشیدنی‌های غیر گازدار نیز به رقیق شدن ترشحات کمک می‌کنند.
- ویتامین C و مولتی ویتامین‌ها: استفاده از ویتامین C به شما در مقابله با آنفولانزا کمک می‌کند. پس تا می‌توانید از میوه ها و سبزیجاتی که حاوی ویتامین C هستند استفاده کنید
- از مصرف غذاهای چرب، سرخ کرده و ادویه‌دار پرهیزید.

## گروه های آسیب پذیر:

- نوزادان و کودکان کمتر از ۵ سال به علت سیستم دفاعی ضعیف بیشتر به این بیماری و عوارض آن مبتلا می‌شوند.
- مبتلایان به بیماری‌های مزمن مثل افراد دیابتی، بیماران قلبی، ریوی، کلیوی، بیماران سرطانی و افرادی که دچار ضعف سیستم ایمنی هستند.
- زنان باردار
- افراد بالای ۵۰ سال بخصوص سالمندان بالای ۶۵ سال چه کسانی بایستی واکسن آنفولانزا را دریافت کنند؟
  - افراد بالای ۵۰ سال
  - تمام کودکان بین ۵-۶ ماه
  - کودکان و بزرگسالان بین ۵ تا ۵۰ سال در صورتی که دچار مشکلات پزشکی مزمن باشند مثل دیابت، نارسائی کلیوی، اختلال تولید گلیکول قرمز، مصرف داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی و ...

- افرادی که همودیالیز می‌شوند، افراد مبتلا به HIV مثبت، مبتلایان به بیماری‌های صعب العلاج، افرادی که تحت درمان های کورتون، رادیوتراپی یا شیمی درمانی هستند
- مبتلایان به آسم
- افراد با چاقی بیش از حد (BMI بالای ۴۰) کودکانی که تحت درمان مزمن با آسپرین هستند

- زنانی که در طول فصل شیوع آنفولانزا باردار می‌شوند
- بزشکان، پرستاران و کارکنان بهداشتی که در بیمارستان و یا آسایشگاهها مشغول بکار هستند.

## چه کسانی نباید واکسن آنفولانزا را دریافت نمایند:

- افرادی که حساسیت شدید به تخم مرغ دارند
- افرادی که در گذشته واکنش شدیدی به واکسن آنفولانزا نشان داده اند
- کسانی که در گذشته سابقه بروز سندرم گیلن باره را پس از ۶ هفته از دریافت واکسن آنفولانزا داشته اند
- کودکان زیر ۶ ماه
- بیماران تب دار (این افراد پس از فروکش کردن بیماری می‌توانند واکسن آنفولانزا دریافت نمایند).