

بسمه تعالی

عنوان:

دندانهای کودکان و پوسیدگی دندان های صدمه دیده کودکان



واحد آموزش

تبدیل مواد غذایی بخصوص مواد قندی به اسید می شود و باعث ایجاد حفره ای در دندانها می گردد که پوسیدگی نام دارد و خود محل تجمع مواد غذایی و میکروبی بیشتری می شود.

منابع:

بهداشت دهان و دندان

دکتر محمدابراهیم رحمانی

شود. گاهی اوقات در بعضی افراد دندانهای عقل ابدأ بوجود نمی آید. گاهی استثناء ممکن است یک یا چند دندان شیری به علت نبودن جوانه دندان دائمی مدت ها در دهان باقی بماند.

اینها غالباً کرسی های دوم شیری هستند که می بایست در حدود ۱۰-۱۲ سالگی بیفتند و به جای آنها کرسی های دوم کوچک دائمی رویش یابد.

علت پوسیدگی چیست؟

میکروب های موجود در روی سطح دندانها (پلاک میکروبی) سبب تخمیر و

است این دندان را با دندان کرسی شیری
اشتباه نمایند.

غالباً رویش دندانها در دخترها اندکسی
زودتر از پسرها صورت می‌پذیرد و
دندانهای فک پایین کمی زودتر از
دندانهای بالا رویش می‌یابد. معمولاً^۱ در ۱۲
سالگی تعداد دندانهای دائمی در دهان به
۲۸ عدد می‌رسد.

در این سن فقط دندانهای دائمی در دهان
وجود دارد، از ۱۶ تا ۱۸ سالگی به بعد
دندانهای عقل رویش می‌یابد که تعداد
آنها ۴ عدد می‌باشد و در این موقع تعداد
دندانهای دائمی مجموعاً ۳۲ عدد می‌

دارد. چون اگر این مراقبتها صورت نپذیرد
ضایعات جبران ناپذیری در جهت رشد و
نکامل صحیح سیستم دندانی و فکی
بوجود می‌آید.

دندانهای دائمی

تعداد دندانهای دائمی در هر فک تکامل
یافته معمولاً ۱۶ عدد و مجموعاً در دو
فك ۳۲ دندان می‌باشد. اولین دندانی
دائمی در شش سالگی بلافاصله در پشت
دومین کرسی شیری در دهان ظاهر می‌
شود که به نام دندان شش سالگی نامیده
شده است و بسیاری از والدین ممکن

تعداد دندانهای شیری در هر فک ۱۰ عدد
و مجموعاً ۲۰ عدد می‌باشد، این دندانها
از سنین حدود شش ماهگی شروع به
رویش می‌نماید و بین سنین ۲ تا ۳
سالگی دندانهای شیری کامل می‌شود.
باید توجه داشت که تا شش سالگی فقط
دندانهای شیری در دهان وجود دارد.

دوران جایگزین دندانهای شیری با دائمی
از شش سالگی تا دوازه سالگی دورانی
است که دندانهای شیری بتدريج می‌افتد
و دندانهای دائمی جایگزین آنها می‌گردد.
رعايت نکات بهداشتی و مراقبت‌های
لازم در دوران جایگزین اهمیت ویژه‌ای