



داروهای روانپزشکی:

الانزاپین

۵

اگر نشانه‌های شما بعد از ۴ هفته بهبود نیافت به پزشک خود اطلاع دهید.

* الانزاپین ممکن است باعث افزایش قند خون گردد.

نشانه‌ها شامل: تشنگی مفرط، افزایش ادرار، تهوع، استفراغ، خواب آلودگی، خشکی پوست و خشکی دهان است.

* اگر شما دیابت دارید، هنگام مصرف الانزاپین باید قند خون به صورت منظم مورد بررسی قرار گیرد.



۴

• مصرف دارو را زودتر از موعد مقرر و بدون نظر پزشک قطع نکنید.

• بیمار را از نظر بروز تب، سفتی عضلانی و اختلال سطح هوشیاری کنترل کرده و در صورت بروز هر کدام از این عوارض پزشک معالج را مطلع نمایید.

مسمومیت و درمان

الانزاپین هیچ آنتی‌دوت خاصی ندارد و در موارد مصرف بیش از حد درمان‌های علامتی انجام می‌شود. مصرف بیش از حد این دارو باعث خواب‌آلودگی و اختلال تکلم می‌شود.

لازم است بیماران از نظر افت فشار، کلاپس عروقی، کما، تشنج یا واکنش‌های دیستونیک کنترل شوند.

ملاحظات حین مصرف دارو

* این دارو را کاملاً طبق دستور پزشک مصرف کنید.

* هرگز این دارو را بیشتر از مقدار و مدت تجویز شده مصرف نکنید.

* از مصرف این دارو در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

* این دارو را با لیوانی پر از آب مصرف کنید.

* معمولاً حدود ۴ هفته طول می‌کشد تا دارو اثر کند.

الانزاپین (Olanzapine)

از گروه داروهای ضدروانپریشی (ضد سایکوز) است.

موارد مصرف

این دارو برای درمان بی‌ثباتی خلق و روانپریشی (اختلالات سایکوتیک) مانند اسکیزوفرنیا به کار برده می‌شود و در کوتاه نمودن دوره بیماری و کم کردن علائم و جلوگیری از حملات بعدی موثر می‌باشد و در بیماران مقاوم به درمان در سایکوز حاد و شدید کاربرد دارد.

نام تجاری

زیپراکس (Zyprexa)

اشکال دارویی

این دارو به صورت قرص های ۲،۵ ، ۵ ، ۱۰، ۱۵ و میلی‌گرمی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

موارد منع مصرف

حساسیت مفرط به دارو

عوارض جانبی

الانزاپین مانند بسیاری از داروهای دیگر علاوه بر مزایای درمانی ممکن است عوارضی هم داشته باشد که این

عوارض همیشه و در تمامی افراد ظاهر نمی‌شود و اگر هم بروز پیدا کند همیشه خطرناک و جدی نیستند. روانپزشک زمانی این دارو را تجویز می‌کند که منافع آن‌ها بسیار بیشتر از عوارضش باشد. عوارض جانبی تغییرات ماندگار و دائمی نیستند بلکه بعثت حضور فعال ماده در بدن ایجاد شده، موقتی بوده و نشان دهنده تاثیر دارو نیز می‌باشد. بسیاری از عوارض دارویی قابل درمان هستند و نیازی به قطع دارو نیست و در اولین فرصت باید با پزشک مشورت شود.

عوارض جانبی دارو معمولاً برگشت‌پذیر و قابل درمان است.

بی‌خوابی، افزایش وزن، سردرد، یبوست خصوصاً در مصرف طولانی مدت، افزایش آنزیم‌های کبدی، افزایش سطح پرولاکتین و کاهش گلبول‌های سفید خون.

تداخل الانزاپین با سایر داروها

مصرف بعضی از داروها به همراه الانزاپین باعث کاهش یا افزایش اثر دارو می‌شود لذا لازم است قبل از مصرف هرگونه دارو با پزشک مشورت کنید.

مصرف همزمان این دارو با داروهای ضد فشار خون و دیازپام موجب افت شدید فشار خون می‌شود.

• این دارو اثر لودوپا را تشدید می‌کند.

نکات قابل توجه در مصرف دارو

• قبل و در حین مصرف الانزاپین، پزشک شما آزمایش قند و چربی‌های خون برای شما تجویز می‌نماید و وزن شما را مرتب کنترل می‌کند. در مورد راه‌های جلوگیری از افزایش وزن بدن مانند رژیم غذایی سالم و ورزش با پزشک خود صحبت کنید.

• در صورت بروز علائم افزایش قند خون شامل مواردی مثل: احساس تشنگی مفرط، تکرر ادرار، گرسنگی بیش از حد، خستگی یا ضعف مفرط با پزشک خود تماس بگیرید.

• از تغییر وضعیت ناگهانی یعنی سریع بلند شدن از حالت خوابیده یا نشسته پرهیز کنید زیرا ممکن است باعث سقوط شما شود.

• هنگام رانندگی یا انجام کارهایی که نیاز به هوشیاری دارد، احتیاط کنید زیرا با مصرف دارو امکان بروز خواب‌آلودگی وجود دارد.

• در صورت بارداری، قبل از مصرف دارو، باردار بودن خود را به پزشک اطلاع دهید.

• در زمان شیردهی، قبل از مصرف دارو با پزشک مشورت نمایید.