



سپارستان میلا و شهریار

(سهامی خاص)



داروهای روانپزشکی:

تری فلئوپرازین

۵

- تزریق عضلانی دارو باید به طور عمیق در یک چهارم فوقانی خارجی عضله سرینی انجام شود.
- فشار خون بسیار قبل و بعد از تزریق پیگیری شود.
- شکل مایع این دارو ممکن است پس از تماس با پوست موجب بروز بثورات پوستی شود.
- دارو ممکن است رنگ ادرار را به صورتی تا قهوه‌ای و رنگ پوست را به خاکستری تا آبی تغییر دهد.



۴

- در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید به محض یادآوری آن را میل کنید ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرارسیده باشد فقط آن نوبت را مصرف کنید و از دو برابر کردن آن خودداری کنید.
- از نوشیدن الکل اجتناب کنید زیرا می‌تواند عوارض جانبی این دارو را افزایش دهد.
- هنگام رانندگی یا انجام کارهایی که به نیاز هوشیاری و آگاهی دارد دارو را با احتیاط مصرف کنید.
- از تغییر وضعیت ناگهانی یعنی سریع بلند شدن از حالت خوابیده یا نشسته پرهیز کنید زیرا ممکن است باعث افتادن شما شود.
- در صورت احساس خشکی دهان می‌توانید آدامس بدون قند بجوید و یا جرعه‌های مکرر آب بنوشید.
- مصرف دارو را زودتر از موعد مقرر و بدون دستور پزشک و ناگهانی قطع نکنید، زیرا قطع ناگهانی دارو باعث بروز علائمی مانند: تهوع، استفراغ، سرگیجه، لرزش، احساس گرما یا سرما، سردرد و بی‌خوابی می‌شود.

تری فلئوپرازین

موارد مصرف

از گروه داروهای ضدروانپریشی (ضد سایکوز) است و برای درمان اضطراب یا روانپریشی (اختلالات سایکوتیک) مانند اسکیزوفرنیا به کار برده می‌شود. این دارو در کوتاه نمودن دوره بیماری و کم کردن علائم و جلوگیری از حملات بعدی مؤثر می‌باشد.

نام تجاری

اسکازینا (Skazina)

اشکال دارویی

این دارو به صورت آمپول و قرص های ۱۰، ۵، ۲، ۱ میلی‌گرمی در دسترس می‌باشد

موارد منع مصرف

حساسیت مفرط به دارو، دپرسیون مغز استخوان، صدمات مغزی، کما.

۱

عوارض جانبی

گیجی، خواب آلودگی، اضطراب، مشکلات خواب (بیخوابی)، تاری دید، سردرد، خشکی دهان، گرفتگی بینی، یبوست، تورم یا ترشح از پستان، افزایش وزن، تورم دست‌ها و پاها، بثورات پوستی، کاهش فشار خون، افزایش اشتها، احتباس ادرار البته لازم به ذکر است که اغلب این عوارض، در ابتدای درمان با دارو، دیده می‌شود و به مرور نسبت به آن‌ها تحمل ایجاد می‌شود. اگر با مصرف داروها مشکلی دارید، حتماً آن را با پزشک خود در میان بگذارید.

تداخل تری فلئوپرازین با سایر داروها

مصرف بعضی از داروها به همراه تری فلئوپرازین باعث کاهش یا افزایش اثر دارو می‌شود لذا لازم است قبل از مصرف هر گونه دارو با پزشک مشورت کنید. مصرف همزمان با لیتیم ممکن است موجب بروز مسمومیت شدید نورولوژیک و کاهش پاسخ درمانی به دارو شود. کافئین و سیگار کشیدن اثرات دارو را کم می‌کند.

۲

قرار گرفتن در معرض نور خورشید ریسک ایجاد واکنش - های حساسیت به نور را بیشتر می‌کند. مصرف توام با الکل سبب اختلال عصبی حرکتی در بیمار می‌شود.

ملاحظات حین مصرف دارو

- این دارو را طبق دستور پزشک مصرف کنید و هرگز بیش از میزان تجویز شده مصرف نکنید و طول درمان با دارو را به مدتی که پزشک‌تان تجویز کرده ادامه دهید.
- ممکن است پزشک‌تان به منظور ایجاد بهترین نتیجه درمانی چندین بار دوز دارو را تغییر دهد.
- برای حصول اثرات درمانی مطلوب، ممکن است چند هفته زمان مورد نیاز باشد.
- این دارو را بعد از مصرف یک دوره طولانی مدت به صورت ناگهانی قطع نکنید.
- با پزشک خود درباره این که چگونه باید از نشانه‌های ترک هنگام قطع مصرف تری فلئوپرازین اجتناب کرد، صحبت کنید.
- تری فلئوپرازین را در مکانی به دور از رطوبت، گرما و نور نگهداری نمایید.

۳