

افزایش قند خون (هاپرگلیسمی)

گروه سنی جوان، بالغین، سالماند



منابع:

سوزان س. اسملتزر، برنداجی، بررسی درس نامه پرستاری بروز و سودارت 2014، ترجمه هاتریم، همکاران؛ ویرایش صدیقه سالمی، تهران: سالمی.

[www.uptodate.com](http://www uptodate com)

برای درمان افزایش قند خون چه کار

باید کرد

- ✓ نوشیدن آب
- ✓ تغییر عادات غذایی
- ✓ تغییر نوع، دوز و فواصل زمانی مصرف داروها با نظر پزشک معالج خودتان.

برای پیشگیری از افزایش قند خون چه


باید کرد

- ✓ مطمئن باشید که از برنامه رژیم غذایی، ورزش و زمان بندی مصرف داروهای خود پیروی می کنید.
- ✓ رژیم غذایی خود را بشناسید و کربوهیدراتهای مصرفی خود را محاسبه کنید.
- ✓ قند خون را بطور منظم اندازه گیری کنید.



✳️ عالیم از دیاد قند خون چیست؟

- که افزایش اشتها و پرخوری
- که افزایش دفع ادرار
- که تشنگی مفرط و مصرف آب فراوان
- که کندی در روند بیبودی زخم ها
- که از دست دادن وزن
- که احساس خستگی و خواب آلودگی
- که خشکی و خارش پوست
- که گزگز و سوزن سوزن شدن کف پا
- که تاری دید



✳️ علل به وجود آورنده قند خون بالا چیست؟

- ✳️ فراموش کردن تزریق دوز انسولین و یا مصرف داروهای خوراکی کاهنده قند خون
- ✳️ مصرف زیاد کربوهیدرات ها. مصرف زیاد غذا و دریافت کالری مازاد بر نیاز بدن



- ✳️ عفونت ها و بیماری ها و استرس
- ✳️ کاهش فعالیت جسمی و ورزش
- ✳️ داروها

✳️ هایپرگلیسمی چیست؟

✳️ به افزایش سطح گلوکز خون بیش از حد طبیعی اطلاق می گردد. دو نوع هایپرگلیسمی وجود دارد:

✳️ قند خون بالای ناشتا: هنگامیکه قند خون پس از 8 ساعت ناشتا بودن به بالاتر از 100 میلی گرم در دسی لیتر می رسد.

✳️ افزایش قند خون پس از صرف غذا: هنگامی که قند خون به بالاتر از 180 میلی گرم در دسی لیتر می رسد.

در افراد سالم این میزان به ندرت بالاتر از 140 میلی گرم در دسی لیتر میرسد. اما پس از مصرف یک غذای سنگین پس از 2-1 ساعت ممکن است سطح گلوکز به 180 میلی گرم در دسی لیتر نیز برسد. بالایودن مداوم قند خون پس از صرف غذا نشانه آن است که فرد در خطر ابتلا به دیابت تیپ 2 قرار دارد.